

Bloqueio atrioventricular de 1° grau | First degree atrioventricular block

- [Definição | Definition](#)
- [Example | Examples](#)

Definição | Definition

A duração do intervalo PR é maior que 200 ms. A frequência cardíaca deve estar entre 50 e 90 bpm.


The duration of the PR interval is greater than 200 ms. The heart rate should be between 50 and 90 bpm.

Example | Examples

Exemplo 1 | Examples 1

Paciente masculino, 52 anos, assintomático. Tem diagnósticos de diabetes mellitus e hipertensão arterial. História de angioplastia prévia. Ao ECG, apresenta intervalo PR > 200 ms e $50 < FC < 90$, compatível com **Bloqueio Atrioventricular de 1º grau**. Observa-se também presença de bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional anterossuperior do ramo esquerdo, bem como sobrecarga atrial direita.

*52-year-old male patient, asymptomatic. He has diagnoses of diabetes mellitus and systemic arterial hypertension. History of prior angioplasty. On ECG, he presents PR interval >200 ms and $50 < HR < 90$, consistent with **first-degree atrioventricular block**. Right bundle branch block, left anterior fascicular block, and right atrial enlargement are also observed.*



Exemplo 2 | Examples 2

Paciente feminina, 27 anos, com queixa de dor torácica. Ao ECG, apresenta intervalo PR > 200 ms e $50 < FC < 90$, compatível com **Bloqueio Atrioventricular de 1º grau**. Há, também, interferência na linha de base que não impede a análise do ECG.

*27-year-old female patient presenting with chest pain. On ECG, she presents PR interval >200 ms and $50 < HR < 90$, consistent with **first-degree atrioventricular block**. There is also baseline interference that does not preclude ECG analysis.*

