

# Suspeita de Síndrome de Brugada | Suspected Brugada syndrome

- [Definição | Definition](#)
- [Exemplo | Examples](#)

# Definição | Definition

Esta mensagem é incluída no laudo quando os achados eletrocardiográficos são compatíveis com suspeita de Síndrome de Brugada: Supra ST < 2 mm nas derivações V1-V2 com morfologia côncava ou em sela.


*This message is included in the report when electrocardiographic findings are compatible with suspected Brugada Syndrome: Supra ST < 2 mm in leads V1-V2 with concave or saddle morphology.*

# Exemplo | Examples

- Exemplo 1 | Example #1

Paciente masculino, 3 anos, em avaliação pré-anestésica. Em uso de risperidona. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular, com supra ST < 2 mm nas derivações V1-V2 com morfologia côncava ou em sela, compatível com **suspeita de Síndrome de Brugada**.

*Male patient, 3 years old, undergoing pre-anesthetic evaluation. Currently taking risperidone. On ECG, he presents regular sinus rhythm with ST elevation < 2 mm in leads V1-V2 with concave or saddle morphology, corresponding to **suspected Brugada Syndrome**.*



- Exemplo 2 | Example #2

Paciente feminina, 73 anos, com queixa de dispneia, dor torácica, palpitações. Ao ECG, apresenta taquicardia sinusal, com ST  $< 2$  mm nas derivações V1-V2 com morfologia côncava ou em sela, compatível com **suspeita de Síndrome de Brugada**. Observa-se, também, baixa voltagem nas derivações periféricas e desvio extremo do eixo de QRS.

*A 73-year-old female patient presenting with dyspnea, chest pain, and palpitations. The electrocardiogram (ECG) shows sinus tachycardia with ST elevation of less than 2 mm in leads V1 and V2 with concave or saddle morphology, consistent with **suspected Brugada Syndrome**. Additionally, low voltage is observed in the peripheral leads, along with an extreme deviation of the QRS axis.*

